

# Compte-rendu Rencontre Technique Terr'Eau Bio – Biosécurité en élevage de volaille Bio – GAEC de Terre-Blanc – ST ROME DE CERNON (12) – 14h

Thème de la rencontre : Biosécurité en élevage de volaille Bio



## **PARTICIPATIONS**

18 participants : 15 agriculteurs, 2 conseillers agricoles et 1 étudiant

## **ANIMATION-COORDINATION**

Alexandre BANCAREL - Chargé de mission élevages biologiques à l'Association pour la Promotion de l'Agriculture Biologique en Aveyron (APABA)

## **INTERVENANTS**

Olivier Patout, vétérinaire à l'Association des Vétérinaires Eleveurs du Millavois

## **PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS**

### **Le virus Influenza Aviaire**

Le virus IA est un problème majeur de santé animale (crise actuelle 2015-2016 dans les élevages de palmipèdes en France). Il s'agit d'une maladie à Plan

d'urgence, étant donné sa capacité de diffusion et son impact sanitaire et économique.

Le virus IA découvert en 2015 dans les élevages français n'est pas transmissible à l'homme mais très virulent pour les volailles.

-Le virus IA HP « hautement pathogène » entraîne de graves manifestations cliniques et/ou une forte mortalité chez les oiseaux.

Le virus IA FP « faiblement pathogène » ne provoque généralement pas ou peu de signes cliniques. Toutefois, il est important de détecter le virus IA FP car il peut muter en virus IA HP.

### **Quelles sont les mesures de prévention?**

-séparation des âges et des espèces grâce aux barrières physiques et fonctionnelles entre les Unités de production

-protection des exploitations contre les potentielles sources de contaminations extérieures : transports, animaux, aliment, litière,

A titre d'exemple, lors des camions d'aliment, le producteur doit s'assurer visuellement leur état de propreté avant leur entrée sur l'exploitation et que le camion stationne si possible sur une aire dédiée et éloignée du sas sanitaire

-nettoyage et désinfection des locaux et parcours suivis d'un vide sanitaire (éviter l'eau stagnante, les zones humides ou boueuses, l'objectif étant d'avoir un parcours herbeux en début de bande et entretenu sur la durée. Il est aussi nécessaire de ramasser régulièrement les cadavres et de les stocker au froid.

*Organisé grâce aux financements de :*

