

Compte-rendu Rencontre Technique Terr'Eau Bio

27/04/2017 – EARL Grascazes (Grascazes – 12120 MELJAC) – 10h

Thème de la rencontre : le pâturage en production caprine biologique



PARTICIPATIONS

19 participants : 10 agriculteurs, 5 conseillers agricoles, 3 porteurs de projets, 1 journaliste agricole

ANIMATION-COORDINATION

Alexandre BANCAREL - Chargé de mission élevages biologiques à l'Association pour la Promotion de l'Agriculture Biologique en Aveyron (APABA)

INTERVENANT

Christel NAYET, conseillère en élevage biologique – Chambre Agriculture de la Drôme

Intérêts/limites du pâturage en production caprine

Intérêts	Limites
<ul style="list-style-type: none">• Économique<ul style="list-style-type: none">- Diminution du concentré- Diminution des stocks- baisse du coût alimentaire (-25 %?)• Temps de travail• Qualité du lait : + AGPI, amélioration rapport oméga 6/3• Demande du consommateur/Image	<ul style="list-style-type: none">• Économique- baisse du lait la 1ère année ?• Surface accessible• Temps de travail• Maîtrise alimentaire et sanitaire

Chèvre : spécificités par rapport au pâturage

La chèvre a un comportement de cueilleur, elle a peu de résistance aux strongles. En production caprine, des résistances de plus en plus importantes sont mis en lumière aux anthelminthiques.

Signe d'une infestation parasitaire

-Chute de la production laitière

-Signes cliniques : amaigrissement, anémie, diarrhée

-Coprologies : 4x an minimum, avant et après traitement


-Les niveaux d'infestation

-0-500 = faible sauf en début de saison

-500 – 1 000 / 1 500 = impact sur la production

-> 1 500 = élevé

Intérêts des plantes à tanin pour limiter le niveau d'infection



Plantes analysées	Teneur en tanin condensé
Pray-grass	1,1 %
Féverole graine	1,5 %
Sainfoin	3,2 %
Frêne feuille	4,5 %
Chêne feuille	5,3 %
Ronces	7,2 %
Noisetier feuilles	14,2 %

Points clés à maîtriser pour optimiser le pâturage

- Surveiller le niveau d'infestation et vérifier la résistance aux traitements
- Commencer la saison de pâturage avec des animaux propres et des parcelles propres
- Éviter l'accumulation de larves sur les prairies : rupture de plus de 45 jours, rotation avec céréales/labour,....
- Favoriser le pâturage mixte

Types de pâturage possibles

Pâturage tournant

Surface par chèvre : 50-60 m²

Durée de présence courte : 3-4 jours

Hauteur d'herbe entrée : 8 à 14 cm / Hauteur d'herbe sortie : 6 cm

Chargement instantané élevé (de 140 à 160 chèvres/ha - 60 chèvres sur des parcelles de 0,2 à 0,45ha)

Pâturage continu

Surface / chèvre : 500 à 1 000 m²

Nombre de parcelles: 3 – 4 (faucher si herbe trop haute)

Chargement instantané faible (35 à 60 chèvres /ha - 60 chèvres pour 3 parcelles entre 1 et 1,7 ha)

Passage rapide entre 2 parcelles, pas de temps de repousse. L'objectif est d'avoir un gazon court, entre 8 et 10 cm

Organisé grâce aux financements de :

